



MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN DE REGULACION DE LA SALUD

Alerta sobre retiro del mercado de medicamentos que contienen Sibutramina

Recomendaciones para la población

La Dirección de Regulación de la Salud alerta a la población sobre su disposición de retirar de la comercialización y cancelar registros sanitarios de los medicamentos que contienen Sibutramina (ver lista abajo), debido a que se ha concluido que los riesgos de su utilización superan los beneficios.

La Sibutramina se ha utilizado en el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso junto con cambios en la alimentación, tanto para disminuir de peso como en el mantenimiento de la disminución de peso.

A continuación se enlistan nombres comerciales de medicamentos que contienen sibutramina, registrados ante el Ministerio de Salud, y para su comercialización:

ANUKIT 10 MG y 15 MG/CAPSULA. LABORATORIOS ROWE REPUBLICA DOMINICANA.

- **ANUKIT 15 / CAPSULA. LABORATORIOS ROWE REPUBLICA DOMINICANA.**
- **BETAGEN 15 MG/CAPSULA. NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA.**
- **CETONIL 10 MG y 15 MG/CAPSULA. GUTIS LTDA COSTA RICA.**
- **CONTROLEX 10 MG y 15 MG /CAPSULA. LABORATORIOS BUSSIE S.A. COLOMBIA.**
- **ESBELTIN 15 MG/CAPSULA. LABORATORIO RAVEN S.A. DE COSTA RICA.**
- **LOWEX 10 MG y 15 /CAPSULA. LABORATORIOS UNIPHARM, S.A. DE GUATEMALA.**
- **MESURA 10 MG y 15 MG/CAPSULA. ANDROMACO S.A. CHILE.**
- **RADUCTIL 10 MG y 15 MG/CAPSULA. ABBOTT LAB. DE MEXICO S..A DE C.V.**
- **SIBUTRAMINA CLORHIDRATO CALOX 10 MG y 15 MG /CAPSULA. CALOX DE COSTA RICA S.A.**

- **SIBUTRAMINA GENFAR 10 MG y 15 MG/ CAPSULA.** LABORATORIOS GENFAR S.A. COLOMBIA.
- **SIBUTRAMINA CLORHIDRATO 15 MG/ CAPSULA.** LABORATORIOS STANTECH PHARMACEUTICALS PVT LDA., INDIA.
- **VINTIX** de 10 MG y 15 MG / CAPSULA. LABORATORIO ROEMMERS S. A. URUGUAY.

A la vez se recomienda a los pacientes:

- Suspender la toma de productos con sibutramina y comunicarse de inmediato con su médico para decidir sobre otras alternativas que puede utilizar para el control de su peso.
- Comunicar a su médico si experimenta o ha experimentado dolor en el pecho, palpitaciones del corazón, cambios en la frecuencia o ritmo cardíaco u otros síntomas como mareo y aturdimiento, con el uso de estos medicamentos.
- Destruir el medicamento para evitar su permanencia en el hogar, mezclando las cápsulas con café molido usado o arena para gatos, y depositándolo en una bolsa plástica cerrada en la basura. El medicamento será menos atractivo para los niños y las mascotas, e irreconocible a las personas que tengan contacto con la basura.
- Informar a su médico o farmacéutico sobre cualquier efecto secundario con el medicamento.

En caso de cualquier duda o consulta puede comunicarse a la Dirección de Regulación de la Salud (Teléfono 2258-6765, 2255 1540).


Ing. Ofirando Rodríguez Baltodano
Director a.i. de Regulación de la Salud



Ed.: MVR.