

**Boletín Epidemiológico N° 17 de 2022**  
**Semana epidemiológica 19**  
**Dirección de Vigilancia de la Salud**

## Tabla de contenido

<b>Dengue</b> .....	<b>2</b>
<b>Chikungunya</b> .....	<b>4</b>
<b>Zika</b> .....	<b>5</b>
<b>Violencia intrafamiliar</b> .....	<b>6</b>

## Dengue

**Adriana Alfaro Nájera**  
Unidad de Epidemiología  
Dirección de Vigilancia de Salud  
[adriana.alfaro@misalud.go.cr](mailto:adriana.alfaro@misalud.go.cr)

Se reportan a la semana epidemiológica 16 a través de notificación obligatoria por boleta VE01, 837 casos de dengue. Como se observa en el cuadro 1 la región Huetar Caribe presenta el mayor número de casos sospechosos (369) y la tasa más alta 78,5/100.000 habitantes.


### Cuadro 1.

**Costa Rica: Casos y tasas de dengue por Región a la semana epidemiológica 16, 2022 (Tasa por 100.000 hab.)**

Región	Casos	Tasa
Huetar Caribe	369	78,5
Central Este	184	32,3
Central Norte	86	8,4
Huetar Norte	61	23,4
Pacífico Central	49	15,7
Brunca	46	12,3
Central Sur	24	1,6
Chorotega	16	3,5
Occidente	2	0,9
<b>Total</b>	<b>837</b>	<b>16,1</b>

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

**Gráfico 1.**  
**Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región por 100.000 habitantes a la semana epidemiológica 16, 2021.**



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

A la presente semana se reporta tres casos graves de dengue uno en la región Huetar Caribe, uno en la Pacífico Central y el tercero en la región Central Sur.

## Chikungunya

Se registran 3 casos a través de notificación obligatoria por boleta VE01 a la semana epidemiológica 16.

### Cuadro 2.


**Costa Rica: Casos y tasas de Chikungunya por Región a la semana epidemiológica 16, 2022 (Tasa por 100.000 hab.)**

Región	Casos	Tasa
Huetar Caribe	2	0,4
Central Sur	1	0,1
Brunca	0	0,0
Central Este	0	0,0
Central Norte	0	0,0
Chorotega	0	0,0
Huetar Norte	0	0,0
Occidente	0	0,0
Pacífico Central	0	0,0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0,1</b>

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

### Gráfico 2.

**Costa Rica: Casos y tasas de chikungunya por región por 100.000 habitantes a la semana epidemiológica 16, 2021.**



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

## Zika


Se registran 8 casos a través de notificación obligatoria por boleta VE01 a la semana epidemiológica 16.

**Cuadro 3.**  
**Costa Rica: Casos y tasas de Zika por Región a la semana epidemiológica 16, 2022 (Tasa por 100.000 hab.)**

Región	Casos	Tasa
Huetar Caribe	4	0,9
Central Sur	3	0,2
Chorotega	1	0,2
Brunca	0	0,0
Central Este	0	0,0
Central Norte	0	0,0
Huetar Norte	0	0,0
Occidente	0	0,0
Pacífico Central	0	0,0
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>0,2</b>

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

**Gráfico 3.**  
**Costa Rica: Casos y tasas de zika por región por 100.000 habitantes a la semana epidemiológica 16, 2022**



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

## Violencia intrafamiliar

**Gloriela Brenes Murillo**

Unidad de Epidemiología  
Dirección Vigilancia de la Salud  
[gloriela.brenes@misalud.go.cr](mailto:gloriela.brenes@misalud.go.cr)

**Kricia Castillo Araya**

Unidad Seguimiento de Indicadores en Salud  
Dirección Vigilancia de la Salud  
[kricia.castillo@misalud.go.cr](mailto:kricia.castillo@misalud.go.cr)

Hablar de la violencia intrafamiliar implica hablar de una larga historia de agresiones desde la infancia. Comprender qué está pasando en la vida de las personas afectadas por la violencia obliga a volver los ojos hacia una larga cadena de agresiones y de intentos inútiles por detener la violencia, que han ido minando las fuerzas y los poderes personales para seguir haciendo intentos de salir de esa violencia. (Quirós, E.)


La violencia intrafamiliar produce serios daños en sus vidas. Miles están siendo silenciadas por el dolor y el agotamiento que produce vivir una cotidianidad en la que se es permanentemente discriminada, abandonada, maltratada, sufriendo la anulación constante de lo único que realmente se puede pensar que es de una misma: la integridad física y psicológica. (Quirós, E.)

La violencia intrafamiliar efectivamente se dirige contra el cuerpo de las personas del grupo familiar percibidos como más débiles y dependientes, pero ese cuerpo no es sólo físico, es un cuerpo psíquico y social, que se convierte en el ser de las personas, en una identidad que es dañada en su integridad, su imagen, su valor, patrimonio, aspiraciones, reconocimiento, sexualidad, sus relaciones interpersonales y su salud. (Londoño, A., 1992).

Los datos que se presentan corresponden a los recibidos durante la semana epidemiológica N°15 de 2022, que va del 10 al 17 abril, al respecto se contabilizan 2286 casos de los cuales 1654 corresponde a las mujeres y 632 a los hombres.

Lo anterior tiene una incidencia femenina de 63.9 y de 24.1 en la población masculina. Claramente esta información indica que las mujeres siguen siendo las más afectadas por la VIF

**Gráfico 1**  
**Costa Rica: porcentaje de casos notificados de VIF según sexo, SE 15, 2022**




Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

El siguiente gráfico brinda la información relacionada con el comportamiento de la VIF en los diferentes grupos de edad durante la SE indicada, es así como preocupa la tendencia en el gráfico de los menores de un año, similar a la anterior SE N°9 los cuales tienen la tasa más alta siendo de 116,1 seguida por el grupo entre los 10 a 14 años con una tasa de 97,1 y de 15 a 19 con una tasa de 90,9, ambas muy por debajo de la anterior del grupo de infantes, debe prestarse atención a estos grupos de población claramente dependientes de los padres y/o encargados. Así mismo la población adulta mayor nuevamente evidencia los rasgos de la violencia aportando una tasa de 62,9.

## Gráfico 2

Costa Rica: incidencia de casos notificados de VIF según grupos de edad, semana epidemiológica N° 15, 2022 (tasa por 100 000 habitantes).




Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

El tercer gráfico evidencia la incidencia de la violencia intrafamiliar a nivel provincial según el sexo de la persona afectada, que de forma particular y recurrente está encabezada por la provincia de Puntarenas zona que se mantiene encabezando este evento desde hace más de dos años. Este importante puerto del pacífico central es en términos sociales y económicos unas de las regiones con un rezago importante en material de indicadores económicos y de crecimiento social, las dificultades que los porteños tienen relacionadas con el acceso a fuentes de trabajo, educación. La incidencia para esta SE fue de 130,2 en mujeres y de 60,4 en hombres muy por encima de Limón y Alajuela que les siguen en ese orden con tasas

de 98,2 en mujeres y 25,2 en hombres limonenses, y de 93,7 en mujeres y 32,7 en hombres alajuelenses.

### Gráfico 3

**Costa Rica: incidencia de casos notificados de VIF por provincia según sexo, a la semana epidemiológica N° 15, 2022 (tasa por 100 000 habitantes).**




Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

Coto Brus, pertenece a la provincia de Puntarenas por lo que no es de extrañar que sea el cantón que lidera la incidencia de casos de violencia intrafamiliar notificados, con una tasa de 492,3 seguido por Orotina que tiene una tasa de 302,7 y más atrás Tarrazú con una tasa de 154,4.

#### Gráfico 4

Costa Rica: incidencia de casos notificados de VIF por cantón, a la semana epidemiológica N°15, 2022 (tasa por 100 000 habitantes)



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

La información de las causas o tipos de violencia según sexo durante la SE 15 indica que las mujeres son nuevamente la población más afectada siendo la negligencia y el abandono la causa principal lo cual coincide con el dato de los grupos de edad y en ambos sexos ya que son población dependientes y vulnerables.

### Cuadro 1


Costa Rica: casos notificados de VIF por diagnóstico específico según sexo, a la semana epidemiológica N° 15, 2022

Diagnóstico específico (CIE-10)	Total	Mujeres	Hombres
<b>Total, general</b>	<u>2286</u>	<u>1654</u>	<u>632</u>
<b>Abuso físico</b>	372	243	129
<b>Abuso psicológico</b>	480	392	88
<b>Abuso sexual</b>	311	282	29
<b>Negligencia o abandono</b>	657	357	300
<b>Otros síndromes de maltrato (formas mixtas)</b>	283	241	42
<b>Síndrome maltrato no especificado</b>	177	135	42
<b>Violencia patrimonial</b>	6	4	2

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

La tendencia de los casos según la SE de notificación indica que la 1 y la 5 tienen la mayor cantidad de casos recibidos, estas semanas corresponden la primera del 2 al 8 de enero y la sexta del 30 de enero al 5 de febrero, períodos de días de “descanso”, de vacaciones y de término de actividades de fin de año 2021, lo que implica al agresor en la casa o cerca de los miembros de la familia.

**Gráfico 6**  
**Costa Rica: casos notificados de VIF según semana epidemiológica de la 1 a la 15, 2022**



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud