

**Boletín Epidemiológico N° 20 de 2022**  
**Semana epidemiológica 22**  
**Dirección de Vigilancia de la Salud**  
**Ministerio de Salud**

## Tabla de contenido

<b>Dengue</b> .....	2
<b>Chikungunya</b> .....	4
<b>Zika</b> .....	5
<b>Violencia intrafamiliar</b> .....	6

## Dengue

**Adriana Alfaro Nájera**  
Unidad de Epidemiología  
Dirección de Vigilancia de Salud  
[adriana.alfaro@misalud.go.cr](mailto:adriana.alfaro@misalud.go.cr)

Se reportan a la semana epidemiológica 19 a través de notificación obligatoria por boleta VE01, 1144 casos de dengue. Como se observa en el cuadro 1 la región Huetar Caribe presenta el mayor número de casos sospechosos (552) y la tasa más alta 117,5/100.000 habitantes.

### Cuadro 1.


**Costa Rica: Casos y tasas de dengue por Región a la semana epidemiológica 19, 2022 (Tasa por 100.000 hab.)**

Región	Casos	Tasa
Huetar Caribe	552	117,5
Central Este	225	39,5
Central Norte	120	11,7
Huetar Norte	75	28,7
Brunca	64	17,1
Pacífico Central	50	16,0
Central Sur	36	2,4
Chorotega	21	4,6
Occidente	1	0,4
<b>Total</b>	<b>1144</b>	<b>21,9</b>

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

**Gráfico 1.**

**Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región por 100.000 habitantes a la semana epidemiológica 19, 2021.**



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

A la presente semana permanecen dos casos graves de dengue uno en la región Huetar Caribe y otro en la Pacífico Central.

## Chikungunya

Se registran 4 casos a través de notificación obligatoria por boleta VE01 a la semana epidemiológica 19.

### Cuadro 2.


**Costa Rica: Casos y tasas de Chikungunya por Región a la semana epidemiológica 19, 2022 (Tasa por 100.000 hab.)**

Región	Casos	Tasa
Central Sur	3	0,2
Huetar Caribe	1	0,2
Brunca	0	0,0
Central Este	0	0,0
Central Norte	0	0,0
Chorotega	0	0,0
Huetar Norte	0	0,0
Occidente	0	0,0
Pacífico Central	0	0,0
Total	4	0,1

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

### Gráfico 2.

**Costa Rica: Casos y tasas de chikungunya por región por 100.000 habitantes a la semana epidemiológica 19, 2021.**



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

## Zika

Se registran 13 casos a través de notificación obligatoria por boleta VE01 a la semana epidemiológica 19.

### Cuadro 3.


#### Costa Rica: Casos y tasas de Zika por Región a la semana epidemiológica 19, 2022 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Huetar Caribe	5	1,1
Central Sur	5	0,3
Chorotega	1	0,2
Central Norte	1	0,1
Pacífico Central	1	0,3
Brunca	0	0,0
Central Este	0	0,0
Huetar Norte	0	0,0
Occidente	0	0,0
Total	13	0,2

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

### Gráfico 3.

#### Costa Rica: Casos y tasas de zika por región por 100.000 habitantes a la semana epidemiológica 19, 2022



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

## Violencia intrafamiliar

### **Gloriela Brenes Murillo**

Unidad de Epidemiología  
Dirección Vigilancia de la Salud  
[gloriela.brenes@misalud.go.cr](mailto:gloriela.brenes@misalud.go.cr)

### **Kricia Castillo Araya**

Unidad Seguimiento de Indicadores en Salud  
Dirección Vigilancia de la Salud  
[kricia.castillo@misalud.go.cr](mailto:kricia.castillo@misalud.go.cr)


La violencia intrafamiliar produce serios daños en sus vidas. Miles están siendo silenciadas por el dolor y el agotamiento que produce vivir una cotidianidad en la que se es permanentemente discriminada, abandonada, maltratada, sufriendo la anulación constante de lo único que realmente se puede pensar que es de una misma: la integridad física y psicológica. (Quirós, E.)

La violencia intrafamiliar efectivamente se dirige contra el cuerpo de las personas del grupo familiar percibidos como más débiles y dependientes, pero ese cuerpo no es sólo físico, es un cuerpo psíquico y social, que se convierte en el ser de las personas, en una identidad que es dañada en su integridad, su imagen, su valor, patrimonio, aspiraciones, reconocimiento, sexualidad, sus relaciones interpersonales y su salud. (Londoño, A., 1992).

Los datos que se indican corresponden al acumulado a la semana epidemiológica N°18 de 2022, al respecto se notificaron 3576 casos de los cuales 2586 corresponde a las mujeres y 990 a los hombres. Lo anterior tiene una incidencia femenina de 99,9 y de 37,7 en la población masculina. Claramente esta información indica que las mujeres siguen siendo las más afectadas por situaciones de violencia en el ámbito intrafamiliar.

### Gráfico 1

#### Costa Rica: porcentaje de casos notificados de VIF según sexo, acumulado a la SE 18, 2022




Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

El siguiente gráfico brinda la información relacionada con el comportamiento de la VIF en los diferentes grupos de edad en el acumulado, es así como llama la atención, el aumento sostenido de casos en menores de un año a lo largo de las semanas epidemiológicas anteriores, para esta la tasa es también la más alta siendo de 166,3, le sigue con la misma tendencia el grupo entre los 10 a 14 años con una tasa de 143,7 y en tercer lugar la población con edades de 15 a 19 con una tasa de 132,4, debe analizarse la situación de estos grupos de población menores de edad ya que están en una posición de dependencia de sus progenitores y /o encargados. Por otro lado, la población adulta mayor mantiene un comportamiento en alza similar a lo notificado a lo largo del año, al respecto en el acumulado tienen una tasa de nuevamente evidencia los rasgos de la violencia aportando una tasa de 118,6 casi el doble de la tasa de la SE N°15.

## Gráfico 2

**Costa Rica: incidencia de casos notificados de VIF según grupos de edad, acumulado a la semana epidemiológica N° 18, 2022 (tasa por 100 000 habitantes).**




Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

En el tercer gráfico se ilustra la incidencia de la violencia intrafamiliar por provincia de ocurrencia según el sexo de la persona afectada, que de forma particular y recurrente por la provincia de Puntarenas zona que se mantiene encabezando este evento desde hace más de dos años. Este importante puerto del pacífico central es en términos sociales y económicos unas de las regiones con un rezago importante en materia de indicadores económicos y de crecimiento social, dificultades relacionadas con el acceso a fuentes de trabajo, educación. La incidencia hasta esa SE fue de 214,8 en mujeres y de 96,1 en hombres, muy por encima de Limón y Alajuela que les siguen en ese orden con tasas de 139 en mujeres y 37,6 en hombres limonenses, y de 127,9 en mujeres y 45,6 en hombres alajuelenses.

### Gráfico 3

**Costa Rica: incidencia de casos notificados de VIF por provincia según sexo, acumulado a la semana epidemiológica N° 18, 2022 (tasa por 100 000 habitantes).**




Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

En cuanto a la notificación por cantones, Coto Brus, de la provincia de Puntarenas lidera la incidencia de casos de violencia intrafamiliar, con una tasa de 702,3 seguido por Orotina que aporta una tasa de 339,5 y más atrás Mora con una tasa de 273,1.

#### Gráfico 4

Costa Rica: incidencia de casos notificados de VIF por cantón, acumulado a la semana epidemiológica N°18, 2022 (tasa por 100 000 habitantes)



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

La información adjunta en el cuadro de las causas o tipos de violencia según sexo, hasta la SE 18 se confirma la constante de que, las mujeres son el grupo de la población más afectada, en este caso se mantiene la negligencia y el abandono como la causa principal información que coincide con el dato en los grupos de edad menores de edad, en ambos sexos que son la población con altos niveles de dependencia económica, familiar y educativa, entre otros. Le sigue el abuso psicológico que no se evidencia más que a través de los efectos o consecuencias tales como: depresión, baja autoestima, apatía, bajas calificaciones, miedo, aislamiento, agresividad, autolesiones, etc.

### Cuadro 1


Costa Rica: casos notificados de VIF por diagnóstico específico según sexo, acumulados a la semana epidemiológica N° 18, 2022

Diagnóstico específico (CIE-10)	Total	Mujeres	Hombres
<b>Total, general</b>	<b><u>3576</u></b>	<b><u>2586</u></b>	<b><u>990</u></b>
Abuso físico	527	345	182
Abuso psicológico	791	646	145
Abuso sexual	454	405	49
Negligencia o abandono	993	538	455
Otros síndromes de maltrato (formas mixtas)	545	456	89
Síndrome maltrato no especificado	244	178	66
Violencia patrimonial	22	18	4

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

En el acumulado por semana epidemiológica el gráfico de tendencia de los casos indica que las SE con la mayor cantidad de casos notificados fueron la 1 y la 11, para posteriormente darse una disminución importante hasta la SE 18, en los datos de VIF, no hay una explicación que se pueda definir como la razón o las razones de estas bajas, se sugiere mantener bajo control la notificación de casos de VIF en cuanto a su completitud y oportunidad, así como en la calidad de esta.

**Gráfico 5**  
**Costa Rica: casos notificados de VIF según semana epidemiológica de la 1 a la 18, 2022**



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud