

Boletín Epidemiológico N°6 de 2023

Dirección de Vigilancia de la Salud

Ministerio de Salud

Tabla de contenido

Dengue	2
Chikungunya.....	5
Zika	5
Malaria	6
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAS y ETI	15
Mpox.....	19
Meningitis	23
Tuberculosis	26
Hepatitis A	30
Intoxicación por metanol	32
Varicela.....	39
Infecciones de Transmisión Sexual	45

Dengue

Adriana Alfaro Nájera
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud
adriana.alfaro@misalud.go.cr

Se reportan a la semana epidemiológica 4 a través de notificación obligatoria por boleta VE01, 298 casos de dengue. Como se observa en el cuadro 1 la región Huetar Caribe presenta el mayor número de casos sospechosos (106) y la tasa más alta 22,3/100.000 habitantes.

Cuadro 1.


Costa Rica: Casos y tasas de dengue por Región a la semana epidemiológica 4, 2023 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Huetar Caribe	106	22,3
Central Este	60	10,5
Central Sur	41	2,7
Huetar Norte	33	12,5
Pacífico Central	23	7,3
Central Norte	18	1,7
Chorotega	15	3,2
Occidente	2	0,9
Brunca	0	0,0
Total	298	5,7

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

Gráfico 1.


Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región por 100.000 habitantes a la semana epidemiológica 4, 2023.



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

Figura 1.


Mapa del número de casos de dengue por cantón a la semana epidemiológica 4, Costa Rica 2023



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Epidemiología


El CNRV-INCIENSA reporta 35 muestras positivas procesadas al 14 de febrero por serotipos identificados de dengue entre estos cuatro serotipos 4.

Figura 2.
Distribución espacial de los serotipos de dengue, Costa Rica febrero 2023.



Fuente: CNRV-INCIENSA

Figura 3.
Distribución espacial de los serotipos 4 de dengue, Costa Rica febrero 2023



Fuente: CNRV-INCIENSA

Chikungunya

Se registra 1 caso a través de notificación obligatoria por boleta VE01 a la semana epidemiológica 4.

Cuadro 2.

Costa Rica: Casos y tasas de Chikungunya por Región a la semana epidemiológica 4, 2023 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Pacífico Central	0	0,0
Central Sur	0	0,0
Huetar Caribe	0	0,0
Central Norte	0	0,0
Chorotega	0	0,0
Brunca	0	0,0
Central Este	1	0,2
Huetar Norte	0	0,0
Occidente	0	0,0
Total	1	0,0

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

Zika

Se registra 1 caso a través de notificación obligatoria por boleta VE01 a la semana epidemiológica 4.

Cuadro 3.

Costa Rica: Casos y tasas de Zika por Región a la semana epidemiológica 4, 2023 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Pacífico Central	1	0,3
Occidente	0	0,0
Central Sur	0	0,0
Central Norte	0	0,0
Huetar Caribe	0	0,0
Chorotega	0	0,0
Central Este	0	0,0
Huetar Norte	0	0,0
Brunca	0	0,0
Total	1	0,0

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Indicadores de Salud

Malaria

Issac Vargas Roldán

Dirección de Vigilancia de la Salud


isaac.vargas@misalud.go.cr

I. Antecedentes.

El comportamiento de la malaria en el país ha tenido un crecimiento de casos sostenido desde el año 2015. A la semana epidemiológica 04 del año 2023 se reportan 27 casos de malaria.

Gráfico 1.

Costa Rica: casos de malaria, del año 2015 a la SE04 del 2023.



Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

En comparación con el año pasado, se ha tenido una leve disminución en la cantidad de casos reportados por semana epidemiológica.

Tabla 1.

Comparativo de casos de malaria reportados por semana epidemiológica, 2022-2023

Semana Epidemiológica	Año 2022	Año 2023	Variación Relativa
1	12	9	-25%
2	11	8	-27%
3	17	9	-47%
4	6	6	0
TOTAL	46	32	-30%


Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

II. Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 9 focos activos, 4 focos residuales inactivos y 3 focos eliminados. Actualmente se están realizando investigaciones ya que se estima la apertura de un nuevo foco activo en la Región Chorotega.

Figura 1.

Costa Rica: Inventario de focos de Malaria, actualización de noviembre 2022.



Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

III. Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 2.

Clasificación del estado Histórico de los focos maláricos, Costa Rica.

FOCO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sarapiquí	No era foco	Activo	Residual inactivo	Residual inactivo	Residual inactivo	Eliminado
Matina	Activo	Residual inactivo	Residual inactivo	Residual inactivo	Eliminado	Eliminado
Limón	No era foco	No era foco	Activo	Residual inactivo	Residual inactivo	Residual inactivo
Barra de Parímina	No era foco	No era foco	No era foco	Activo	Residual inactivo	Residual inactivo
Las Millas	No era foco	No era foco	No era foco	No era foco	Activo	Residual inactivo
Pital	Activo	Activo	Residual inactivo	Residual inactivo	Residual inactivo	Activo
Boca Arenal	No era foco	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
Monterrey	No era foco	No era foco	Activo	Residual inactivo	Residual inactivo	Residual inactivo
Crucitas - Llano Verde	No era foco	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
Los Chiles	No era foco	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
El Roble	No era foco	Activo	Residual inactivo	Residual inactivo	Residual inactivo	Eliminado
Chomes	No era foco	No era foco	Activo	Residual inactivo	Residual inactivo	Residual inactivo
El Jardín	No era foco	No era foco	No era foco	No era foco	No era foco	Activo
Quepos	No era foco	No era foco	No era foco	No era foco	No era foco	Activo
Parrita	No era foco	No era foco	No era foco	No era foco	No era foco	Activo
Jicarito	No era foco	No era foco	No era foco	No era foco	No era foco	Activo
La Leona	No era foco	No era foco	No era foco	No era foco	No era foco	Activo

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Tabla 3.

Clasificación del estado actual de los focos maláricos, Costa Rica.


FOCO	Año activación de Foco (ó Reactivación)	Residual Inactivo	Eliminado	Estado actual al 2022
Los Chiles	2018	sigue activo	N/A	ACTIVO
Boca Arenal	2018	sigue activo	N/A	ACTIVO
Crucitas-Llano Verde	2018	sigue activo	N/A	ACTIVO
Monterrey (Montelimar)	2019	2020, 2021, 2022	2023	RESIDUAL INACTIVO
Pital	2017 (R: 2021)	2022, 2023, 2024	2025	ACTIVO
Chomes (Morales)	2019	2020, 2021, 2022	2023	RESIDUAL INACTIVO
El Roble (Barranca)	2018	2019, 2020, 2021	2022	ELIMINADO
Parrita	2022	2023, 2024, 2025	2026	ACTIVO
Quepos	2022	2023, 2024, 2025	2026	ACTIVO
Sarapiquí	2018	2019, 2020, 2021	2022	ELIMINADO
Barra Parímina	2020	2021, 2022, 2023	2024	RESIDUAL INACTIVO
Matina	2016 (R: 2017)	2018, 2019, 2020	2021	ELIMINADO
Limón	2019	2020, 2021, 2022	2023	RESIDUAL INACTIVO
Millas	2021	2022, 2023, 2024	2025	RESIDUAL INACTIVO
El Jardín	2022	2023, 2024, 2025	2026	ACTIVO
La Leona	2022	2023, 2024, 2025	2026	ACTIVO
Jicarito	2022	2023, 2024, 2025	2026	ACTIVO

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

IV. Estratificación del riesgo.

Se cuenta en el país con una estratificación de riesgo de malaria, con actualización a noviembre de 2022. La estratificación se realiza según criterios de vulnerabilidad y receptividad, a nivel nacional se cuenta con ubicaciones geográficas clasificadas en el estrato 1, el cual es no receptivo y no vulnerable, hasta estratos 4, los cuales son receptivos, vulnerables y con transmisión autóctona del parásito.

Figura 2.
Costa Rica: Estratificación del riesgo de malaria.




Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

V. Comportamiento.

A la semana epidemiológica 04, se han reportado a nivel nacional un total de 32 casos confirmados por malaria. La Región con la mayor cantidad de casos en el 2023 es la Huetar Norte, con un total de 28 casos, seguido de la Región Huetar Caribe con un total de 3 casos, en la Región Brunca se ha reportado 1 caso y en la Región Chorotega se reporta también 1 caso.

Gráfico 2.

Costa Rica: casos de malaria a la SE04,2023.



Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Programa Manejo Integrado de Control de Vectores.

I. Trabajos efectivos en viviendas.

Desde el Programa Manejo Integrado de Control de Vectores (PMICV), se realizan visitas en las viviendas de las diferentes localidades del país, en atención a la notificación de arbovirosis. Estas visitas a los domicilios consisten en la ejecución de fumigaciones y eliminación/tratamiento de criaderos. Se hace un llamado a la población para que de mantenimiento e inspeccionen su hogar con el fin de reducir la cantidad de criaderos donde se desarrolla el vector transmisor de arbovirosis.

Tabla 4.

Trabajo efectivo en viviendas, a la SE04, Costa Rica 2023.

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA	VIVIENDAS							
	Programadas	Visitadas	Porcentaje de viviendas visitadas	Cerradas	Renuentes	Positivas	Indice de vivienda	Rango
1	1466	1171	79,88%	287	8	43	4	BUENO
2	11041	9136	82,75%	1756	140	427	5	BUENO
3	13451	11370	84,53%	2012	69	435	4	BUENO
4	9777	8427	86,19%	1373	67	308	4	BUENO
Totales	35 735	30104	0,00%	5428	284	1213	15,83	0

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Al mismo tiempo, al ver los datos de viviendas cerradas y renuentes, se le solicita a la población permitir a los colaboradores del PMICV ingresar a sus viviendas para realizar sus trabajos de fumigación, inspección y eliminación/tratamiento de criaderos.

Figura 3

1. Identificación de Inspectores del Servicio Civil que realizan visitas domiciliarias.



Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

II. Termonebulización.

A continuación, se brinda detalle de la cantidad de viviendas fumigadas a nivel nacional para la semana epidemiológica del año 2023.

Tabla 5.

Viviendas fumigadas por termonebulización a la SE04 del 2023.

Semana Epidemiológica	Viviendas Nebulizadas
1	804
2	1952
3	4339
4	4976
TOTAL	12071

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

III. Fumigación UVL.

Ministerio de salud realiza también fumigaciones con máquina de ultrabajo-volumen en frío (UVL), que impactan directamente sobre la forma adulta del vector, bajando su densidad en puntos geográficos específicos.

Tabla 6.
Viviendas fumigadas por UVL a la SE04 del 2023.

Semana Epidemiológica	Viviendas Nebulizadas
1	0
2	0
3	8400
4	8400
TOTAL	16800

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

IV. Tratamiento focal.

El tratamiento focal corresponde a todas aquellas acciones que se ejecutan por los colaboradores del PMICV en la inspección, eliminación y tratamiento de criaderos donde se desarrollan vectores transmisores de enfermedades.

Tabla 7.
Terrenos Baldíos trabajados a la SE04 del 2023.

Semana Epidemiológica	Existentes	Trabajados	Positivos
1	59	45	2
2	590	514	21
3	391	346	4
4	590	565	5
TOTAL	1630	1470	32

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Tabla 8.

Depósitos (criaderos) trabajados a la SE03 del 2023.

Semana Epidemiológica	Inspeccionados	Tratados	Eliminados	Positivos
1	10338	8438	1900	58
2	53617	38831	14390	658
3	54308	37660	16238	684
4	46122	31300	15182	475
TOTAL	164385	116229	36239	1875

Fuente: Control de Vectores, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAS y ETI

Nancy Mesén Arce

Dirección de Vigilancia de la Salud

nancy.mesen@misalud.go.cr

Roberto Arroba Tijerino

Dirección de Vigilancia de la Salud

roberto.arroba@misalud.go.cr


A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 4 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 4 son 33.742.
- Los grupos por edad quinquenal con más casos notificados son:
 - 1-4 años: n = 5450
 - 5-9 años: n= 3618
 - 20 a 24 años: n= 2914

Mapa 1.

Incidencia de IRAS según Región del Ministerio de Salud, acumulada a la Semana Epidemiológica 4, del 2023. Tasa p/100.000 habitantes.




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 1, se observa las regiones del Ministerio de Salud que presentan más casos de IRAS notificados de a la semana 4, corresponden a la Región Central Sur, Región Pacífico Central, Región Central Norte y Chorotega. Las regiones con menos casos corresponden a la Central Este, Huetar Caribe, Huetar Norte y Occidental. La Región Brunca no reporta casos en las primeras semanas del año.

Gráfico 1.

Casos de IRAS notificados por Región del Ministerio de Salud en Costa Rica, Semana epidemiológica 4, 2023.




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 4 son n= 496.
- Los grupos por edad quinquenal con más casos notificados son:
 - 1-4 años: n = 86
 - Menos de 1 año: n= 59
 - 20 a 24 años: n=49
 - 25 a 29 años: n= 40

Mapa 2.

Incidencia de ETI según Región del Ministerio de Salud en Costa Rica, acumulada a la Semana Epidemiológica 4, del 2023. Tasa p/100.000 habitantes.




Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 2, se observa las regiones del Ministerio de Salud que presentan casos de ETI notificados a la semana 4, las Regiones con más casos son la Huetar Norte, Central Sur, Central Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe. Con menos casos se presenta la Central Este, Occidental y Chorotega.

Gráfico 2.

Casos de ETI notificados por Región del Ministerio de Salud en Costa Rica, Semana Epidemiológica 4, 2023.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Mpox

Nancy Mesén Arce

Dirección de Vigilancia de la Salud

nancy.mesen@misalud.go.cr

La enfermedad fue descubierta en 1958, cuando ocurrieron dos brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos mantenidos para labores de investigación. El primer caso humano fue notificado en agosto de 1970 en Bokenda, una aldea remota en la provincia ecuatorial de la República Democrática del Congo, la familia del paciente indicó que en ocasiones comían monos como un manjar, aunque no podían recordar si habían comido monos durante el último mes o si el niño estuvo en contacto con un mono antes de presentar síntomas. La investigación demostró que el niño era el único de la familia que no había sido vacunado contra la viruela humana. La viruela ha sido erradicada, la viruela del simio no.

La mpox se trata de una infección zoonótica rara emergente, que puede propagarse a los humanos y que suele aparecer en África occidental y central, dónde ahora es endémica. Es causada por el virus de la viruela del mono, un ortopoxvirus similar al virus Variola (el agente causante de la viruela), al virus de la viruela bovina y al virus Vaccinia. Desde la erradicación de la viruela, esta enfermedad ha asumido el papel del ortopoxvirus más destacado que afecta a las comunidades humanas.

A nivel mundial la OMS reporta 85.885 casos confirmados, con 240 casos nuevos del 7 al 13 de febrero, según el reporte de los Estados miembros, al 13 febrero 2023, sigue predominando la Región de las Américas con la mayor cantidad de casos confirmados con 58.346. El segundo lugar lo ocupa la Región de Europa con 25.832 casos confirmados acumulados, tal y como se puede observar en la Figura 1. Entre semana epidemiológica 5 a la 6 se presentó un porcentaje de variación positivo de 83,5% en las Américas.

Figura 1.
Regiones de la OMS: Total de casos acumulados de viruela símica, al 13 de febrero, 2023.


Región de la OMS	Casos acumulados			% Variación	Países/territorios que notifican al menos 1 caso		Última notificación
	Total	SE6	SE5		Últimos 21 días	Total	
África	1.341	39	0	-	4	10	06-feb-2023
Américas	58.346	233	127	83,5	16	31	13-feb-2023
Europa	25.832	7	21	-66,7	10	45	10-feb-2023
Mediterráneo Oriental	82	0	0			10	22-ene-2023
Pacífico Occidental	244	1	8	-87,5	2	10	09-feb-2023
Sudeste Asiático	40	0	3	-100,0	1	4	01-feb-2023

Datos actualizados hasta: 13/02/2023

Fuente de datos: Información recibida de los Puntos Focales Nacionales (CNE) del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) o publicada en los sitios web de los Ministerios de Salud, Agencias de Salud o similares

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, Reporte del 13 enero 2023.

Figura 2.
Regiones de la OMS: Síntomas de los casos confirmados de viruela símica, al 13 de febrero 2023.




Fuente: Organización Panamericana de la Salud, Reporte al 13 febrero 2023.

Situación Nacional

En Costa Rica, desde junio 2022 al 13 febrero 2023, se han investigado preliminarmente 334 casos de mpox, posteriormente, se clasificaron según el resultado de laboratorio, en 153 casos descartados y 178 casos confirmados. En gráfico 1 puede observarse desde la SE 43 del año 2022, una tendencia creciente al aumento de casos estudiados y confirmados con un pico en semana 52 donde se confirmaron 21 casos. En la semana 6 se presenta un descenso en la cantidad de casos confirmados teniendo 5 casos con respecto a los 12 confirmados en semana 4 y 5 respectivamente.

Gráfico 1.

Casos de mpox notificados en Costa Rica, año 2022 a 1a SE 6 del 2023.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud.


Los casos confirmados por laboratorio se caracterizan por ser en su mayoría masculinos con una edad promedio de 33,3 y una mediana de 32 años. De la semana 51 del 2022 a semana 4 del 2023 se confirmaron 4 casos en mujeres y de la semana 2 a la 3 del presente año se confirmaron 3 casos en menores de edad.

El 18.5% registran antecedentes de viajes a otros países. Del total de los casos el 7.9% son extranjeros y un 68% corresponde a costarricenses.

El 55% de los casos confirmados tienen antecedentes de patologías que comprometen el sistema inmune.

La Región Central Sur registra el mayor número de casos confirmados y como puede verse en el gráfico 2 se han presentado más casos confirmados en la provincia de San José, seguido por Heredia, Alajuela y Cartago. En la provincia de Puntarenas sólo se presentan 3 casos por el momento y 1 caso en Guanacaste.

Gráfico 2.
Casos de mpox confirmados según provincia de residencia al 9 febrero 2023, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud.

Hasta el momento no se ha presentado ningún fallecimiento a causa de esta enfermedad y los escasos casos que han requerido internamientos por periodos breves han tenido una adecuada recuperación.

Los casos confirmados inician con signos y síntomas, caracterizados por cefalea, mialgias y fiebre, posteriormente, presentan un rash o erupción en brazos, piernas, tórax y área anogenital, que progresa en etapas secuenciales de maculas a pápulas, luego a vesículas, pústulas, y finalmente a costras (estas lesiones en piel o mucosa desaparecen en un rango de 11 a 35 días).

Los esfuerzos y resultados para mantener una vigilancia epidemiológica activa se deben al trabajo en equipo de los profesionales de las instituciones C.C.S.S, el Inciensa, el sector privado y el Ministerio de Salud en los tres niveles de gestión.

Meningitis

Franchina Murillo Picado

Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud
franchina.murillo@misalud.go.cr

Paola Pérez Espinoza

Unidad de Indicadores
Dirección de Vigilancia de la Salud
paola.perez@misalud.go.cr

La meningitis es una peligrosa inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causada principalmente por una infección bacteriana o vírica.

La meningitis causada por una infección bacteriana suele ser la más grave que provoca unas 250,000 muertes por año y posibles epidemias de rápida propagación. Ocasiona la muerte de una de cada diez personas infectadas, en su mayoría niños y jóvenes y deja a una de cada cinco con discapacidades duraderas, como convulsiones, pérdida de audición y visión, daños neurológicos y deterioro cognitivo.


En Costa Rica, a la semana epidemiológica 04 del año 2023, se han notificado un total de 08 casos a través de boleta VE01 por sospecha de meningitis y en el año 2022 se reportó un total de 02 casos de meningitis con respecto a la misma semana con un aumento del 300%.

De las 9 Regiones del Ministerio de Salud, la Región Central Este presenta 5 de los 8 casos, seguido de la Región Central Sur y Chorotega ambas con un caso respectivamente.

En el año 2022 la Región Central Este y Pacífico Central presentaron un caso cada una.

Figura 1.

Costa Rica: Casos sospechosos de meningitis comparativa año 2022 con el 2023 a la semana epidemiológica 04, 2023



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

Cuadro 1.


Costa Rica: Casos sospechosos y tasas de meningitis según cantón de procedencia, a la semana epidemiológica 04, 2023. (tasa p/100.000 habitantes)

Cantón	casos	tasas
Tilarán	1	4,5
El Guarco	2	4,2
Paraíso	1	1,6
Turrialba	1	1,4

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

En el cuadro 1 se enlista los cantones que presentan tasas mayores de meningitis a la semana epidemiológica 04. El cantón de Tilarán presenta la tasa más alta de meningitis en todas sus formas. El Guarco, Paraíso y Turrialba pertenecen a la provincia de Cartago.

Figura 2.
Costa Rica: Casos sospechosos por meningitis según sexo y edad, a la semana epidemiológica 04, 2023



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

La figura 2, indica la distribución de los casos sospechosos según sexo y grupo de edad. Para la semana epidemiológica 04, se notifican seis hombres y dos mujeres. De los ocho casos reportados 6 se encuentran entre los 25-45 años, grupo de edad económicamente productivo.

Tuberculosis

Franchina Murillo Picado

Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud
franchina.murillo@misalud.go.cr

Kricia Castillo Araya

Unidad de Indicadores
Dirección de Vigilancia de la Salud
kricia.castillo@misalud.go.cr

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria (*Mycobacterium tuberculosis*). Se transmite de una persona a otra a través de gotículas de aerosol suspendidas en el aire expulsadas por personas con enfermedad pulmonar activa. Esta infección puede ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa son tos, a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna.


En Costa Rica, según el Decreto 40556-S, la tuberculosis se ubica dentro del grupo D de enfermedades de notificación obligatoria, tiene su propio libro de registro de casos y se envía a los niveles superiores trimestralmente.

Debido a la cantidad reducida de casos que se presentan anualmente, Costa Rica se encuentra entre los 15 países de la Región con mayor oportunidad para avanzar hacia la eliminación de la TB.

A continuación, se presentan datos con estadística descriptiva, acerca de la situación epidemiológica del país en los últimos años con el fin de conocer el comportamiento del evento a nivel nacional.

Figura N° 1.

Costa Rica: Incidencia y Mortalidad por Tuberculosis por cada 100. 000 habitantes, 2004-2021



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USI

Tanto la incidencia como la mortalidad muestran una tendencia a la baja desde inicios de la serie, con excepción del año 2018 y 2021, es de importancia recordar que los últimos dos años comprenden el período de pandemia por lo que no deben ser utilizados como parámetro de análisis, además cabe destacar que las fluctuaciones en los datos pueden deberse a la poca cantidad de casos presentados, lo que puede ocasionar variaciones importantes con cambios mínimos en números pequeños.

Tabla 1.

Costa Rica: Casos notificados de tuberculosis según Región, números absolutos y tasas (tasa por 100.000 habitantes), año 2018-2022

REGIÓN	2018		2019		2020		2021		2022	
	Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA
Brunca	26	7,1	28	7,6	26	7,0	24	6,5	15	4,0
Central										
Este	22	4,0	21	3,8	18	3,2	12	2,1	23	4,0
Central										
Norte	73	7,5	83	8,4	54	5,4	52	5,1	49	4,8
Central Sur	122	8,3	106	7,1	105	7,0	136	9,0	117	7,7
Chorotega	46	10,6	46	10,4	37	8,3	30	6,6	38	8,3
Huetar										
Caribe	57	12,7	72	15,8	65	14,1	67	14,4	68	14,5
Huetar										
Norte	23	9,4	20	8,0	12	4,7	14	5,4	26	10,0
Occidental	5	2,3	7	3,2	5	2,3	0	0,0	9	4,0
Pacífico										
Central	34	11,6	40	13,4	24	7,9	22	7,2	30	9,6
TOTAL	408	8,2	423	8,4	346	6,8	357	6,9	375	7,2


Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USI

La Región Huetar Caribe es la región que ha presentado en el último quinquenio las tasas de incidencia más altas en todos los años. En el año 2022 le sigue la Región Huetar Norte con una tasa de 10,0.

La Región Occidente es la que ha presentado tasas más bajas de incidencia en todo el período.

Figura 2.

Costa Rica: Distribución de casos de tuberculosis según sexo y grupo de edad quinquenal en el año 2022



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USI

El 2022, se presentaron 375 casos de TB, de los cuales el 67,5% son hombres (n=245) y el 31,7% son mujeres (n=119), una razón de 2.12 hombres por mujer. De los casos, el 82,1% (n=305) se encuentran comprendidos entre las edades de 20 a 69 años que corresponde al grupo laboralmente productivo.

Hepatitis A

Ted Alpízar Calvo
Unidad de Epidemiología
Dirección Vigilancia de la Salud
ted.alpizar@misalud.go.cr

País reporta 14 casos de hepatitis A a la semana epidemiológica cinco

Según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, a la semana epidemiológica cinco, se reportan 14 casos confirmados por laboratorio de hepatitis A en el país, con un rango de edad de tres a 58 años. Es importante aclarar, que a la fecha no existe ningún brote en el país por esta enfermedad.

Dichos casos se distribuyen ocho en San José, dos en Alajuela, dos en Heredia, uno en Cartago y uno en Limón.

Figura 1.

Costa Rica: Casos confirmados por laboratorio de Hepatitis A

CANTÓN	CASOS
Zapote	1
Desamparados	2
Guadalupe	1
Coronado	1
Curridabat	1
La Uruca	2
Naranjo	1
Palmares	1
Santo Domingo	1
San Pablo	1
Cartago	1
Limón	1
TOTAL	14

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Unidad de Epidemiología.

La Hepatitis A es una enfermedad viral que se transmite de persona a persona por vía fecal-oral, y en algunos casos, como en niños menores de seis años, es usual que la infección curse sin síntomas o con síntomas muy leves. El periodo de incubación de esta enfermedad en promedio es de 14 a 28 días

Los principales síntomas presentados por los pacientes son malestar general, ictericia, náuseas, coluria (bilis en la orina), anorexia, vómitos, acolia (decoloración de las heces), diarrea y fiebre. Es por esta razón, que el Ministerio de Salud hace un llamado a la población que, en caso de presentar dichos síntomas, acudan al centro de salud más cercano.

Asimismo, el Ministerio de Salud a través de sus 82 Áreas Rectoras de Salud, realiza de manera constante visitas en las comunidades con el fin de captar de manera oportuna algún caso por esta enfermedad.

Intoxicación por metanol

La intoxicación por metanol un alcohol tóxico, no apto para bebidas es una de las patologías de más alta mortalidad en urgencias. Al ser una patología no común y con síntomas y signos no específicos muchas veces la pasamos por alto y con esto aumentamos su mortalidad. Este es uno de los padecimientos que ante la alta sospecha en la historia clínica y sintomatología debemos abordar de inmediato con el fin de evitar un desenlace fatal. Sus síntomas se deben principalmente al acúmulo de ácido fórmico que causa alteraciones pulmonares, metabólicas, neurológicas y renales. Es un padecimiento el cual debe notificarse una vez confirmado el diagnóstico con el fin de realizar un barrido y encontrar los causantes, antes de evitar brotes mayores.

El Decreto de Vigilancia de la Salud N° 40556-S, indica que la intoxicación con metanol es de notificación obligatoria al Ministerio de Salud debido a su impacto en la salud pública; ya que puede causar un cuadro grave de intoxicación, discapacidad en la persona e inclusive la muerte, si no se trata oportunamente. Por este motivo, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son cruciales para mejorar el pronóstico.

El Ministerio de Salud de Costa Rica haciendo uso de sus potestades, que le confiere la legislación, establece los lineamientos que deben seguir los establecimientos de salud públicos y privados, cuando se presenten casos de intoxicación con metanol. Se pretende con los lineamientos orientar al personal de salud, en los procedimientos a seguir para evitar las discapacidades y la mortalidad que podrían producir este tipo de intoxicación.

Alertas 2019

El 5 de julio de 2019 el Ministerio emitió alerta por la adulteración con metanol de un producto identificado en su etiqueta como “Guaro Montano”, según las muestras recolectadas, el miércoles 10 de julio de 2019 se amplió a “Aguardiente Barón Rojo, Molotov y Timbuka”, jueves 18 de julio de 2019, la alerta se amplió con “Guaro Gran Apache” y “Aguardiente Estrella Roja”, al día 26 de julio se amplía la alerta con “Guaro Sacheto”, el día 30 de julio de 2019, se amplió la alerta sanitaria con “Guaro Cuerazo” y el día 31 de julio de 2019, se amplió la alerta sanitaria con “Guaro Chonete”.

Alertas 2020

A partir del 30 de setiembre del 2020 se reportan nuevos casos sospechosos de intoxicación por licor con marcas distintas a las incluidas en la alerta del 2019. El 15 de octubre del 2020 se emite Alerta Sanitaria para el producto etiquetado como “Guaro Fiesta Blanca” ya que se comprobó que tenía porcentajes altos de metanol.

Alertas 2021

En seguimientos a las intoxicaciones y defunciones por ingestión de metanol se reportaron casos por alcoholes multiuso.

Se identifican dos marcas y el 14 de enero del 2021 se emite Alerta Sanitaria para los alcoholes multiuso “Wash &CO” Alcohol Multiuso 80%” y “Alcohol Multiuso 80%”, este último reenvasado por Matrix Cleaner Deluxe. El 01 de febrero se realiza ampliación de la alerta sanitaria alcoholes multiuso con metanol, para el producto “Alcohol Multiuso BDS Distribuidora”. El 26 de marzo del 2021 se amplía esta alerta sanitaria, ya que se detectó otro producto que contiene metanol y no cuenta con registro sanitario. Este es el “Alcohol Multiuso Brisas del Valle”, al 80%.

Dentro de estas determinaciones se reporta el contenido de metanol, el cual, en ciertas muestras es superior al límite permisible de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica de Bebidas alcohólicas. Guaro y otros aguardientes.

Alertas 2022

El 11 de enero del presente en atención de una investigación relacionada a una muerte por sospecha de consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Se identifica producto falsificado Guaro Cacique, con menor contenido alcohólico que el permitido por normativa, aunque el contenido de metanol se encontró por debajo de los límites permisibles.

En información suministrada el 09 de febrero por Vigilancia de la Salud, se identifica que uno de los fallecidos se intoxicó con supuesto Guaro CACIQUE de dudosa procedencia, Se tiene conocimiento que ha habido una disminución de producción de Guaro CACIQUE por parte de la FANAL, lo que ha aumentado la falsificación de este producto.

Zonas afectadas: Las localidades de La Carpio, Hatillo, Sagrada Familia, Cartago, La Unión de Tres Ríos, Granadilla, Curridabat, Upala, La Cruz, Liberia, Oreamuno, San Pablo de Heredia, San Ramón, Tirrases.

Población afectada: Población vulnerable, asentamientos informales, consumidores de bebidas alcohólicas.

Impacto a la salud: La intoxicación por metanol puede generar vómitos intensos, agitación, desorientación, ceguera, convulsiones, alteraciones visuales o incluso la muerte. El país se encuentra en estado de emergencia debido a la pandemia de COVID 19, los casos por intoxicación por metanol pueden generar mayor presión en los servicios de salud.

Acciones de respuesta: A nivel central se realiza la Vigilancia del evento y las coordinaciones necesarias. Se realiza el estudio epidemiológico de cada uno de los casos notificados. Reuniones periódicas con el grupo de trabajo CCSS y DVS, en la actualización y consolidado de la base. Ejecución de plan de trabajo de acuerdo al lineamiento nacional para efectos operativos. Se está trabajando en coordinación con los niveles locales y regionales para que estén alertas a los incidentes del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuadro 1

Costa Rica: Casos y fallecidos sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro, indicador seleccionado por sexo. Del 1 de enero al 15 de febrero 2023.

Indicador	Sexo biológico notificado		
	Mujeres	Hombres	Total
Morbilidad			
Número de casos (vivos)	0	1	1
Porcentaje (%) del total	0	100	100
Rango edad (años)	0	44	44
Promedio edad (años)	0	44	44
Edad desconocida (incluidos total)	0	0	0
Mortalidad			
Número (fallecidos)	0	2	2
Porcentaje (%)	0	100	100
Rango edad (años)	0	43-54	43-54
Promedio de edad (años)	0	48,5	48,5
Edad desconocida	0	0	0
Total (número de vivos y fallecidos)	0	3	3

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

Cuadro 2

Costa Rica: Casos y fallecidos sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro, por provincia, cantón y condición de egreso. Del 1 de enero al 15 de febrero 2023.

Provincia	Cantón	Condición de egreso		Total
		Fallecidos	Vivos	
San José	San José		1	1
Alajuela	Alajuela	1		1
Guanacaste	Liberia	1		1
Total (2023)		2	1	3

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

Cuadro 3

Costa Rica: Casos y fallecidos sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro por grupos de edad y por condición egreso. Del 1 de enero al 15 de febrero 2023.

Grupos de edad (años)	Condición de egreso		Total
	Fallecido	Vivo	
20-29	0	0	0
30-39	0	0	0
40-49	1	1	2
50-59	1	0	1
60-69	0	0	0
70 y mas	0	0	0
Desconocido	0	0	0
Total	2	1	3

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

Cuadro 4

Costa Rica: Casos y fallecidos sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro por condición y año de ocurrencia. Del 1 de enero al 15 de febrero 2023.

Condición	Año de ocurrencia					Total
	2019	2020	2021	2022	2023	
Fallecido	75	52	22	6	2	157
Casos (Vivo)	51	46	27	6	1	131
Total (2019-2023)	126	98	49	12	3	288

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

Figura 1
Mapa metanol acumulado 2019-2023.





Figura 2.
Mapa metanol 2023.



Varicela

José Aarón Agüero Zumbado

Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud
aaron.aguero@misalud.go.cr

Karla Rodríguez Rosales

Unidad de Rectoría Proceso de Vigilancia
Dirección Región Central Norte
karla.rodriguez@misalud.go.cr

La varicela, es una enfermedad infectocontagiosa, de carácter benigno, ampliamente distribuida en el mundo producida por el Virus de Varicela Zóster, se caracteriza por fiebre moderada de 37,7 – 38,8°C, continua de 24 – 48 horas, exantema maculopapular pruriginoso, rápidamente progresivo, con máculas que duran horas y evolucionan en 5 - 7 días a vesículas, pústulas y costras. Las lesiones aparecen inicialmente en cabeza, cara y tronco superior y se extienden centrífugamente hacia el resto del cuerpo, coexistiendo simultáneamente lesiones en diferentes fases. La intensidad de la erupción es muy variable, el número medio de lesiones es de 300 pero puede limitarse a 10 o extenderse a más de 1 500, dependiendo de la edad y de la inmunidad del huésped.

Este evento se vigila desde el año 1980, es de notificación obligatoria desde abril de 1983 según el Decreto Ejecutivo N° 14496-SPPS, a través de la Boleta VE01, actualmente se siguen las indicaciones señaladas en el Decreto de Vigilancia de la Salud N° 40556 - S publicado en la Gaceta N° 206 del 23 de agosto del 2017. Este evento pertenece al Grupo A, y la notificación debe hacerse semanalmente para conocer su distribución y comportamiento.

En América Latina, en el último quinquenio, se ha reportado una tasa de incidencia de 270 casos por cada 100 000 habitantes y una tasa de hospitalización de 3,5 casos por cada 100 000 habitantes.

En Costa Rica antes de la introducción de la vacuna se reportaban anualmente tasas que oscilaban entre 400 - 800 casos por cada 100 000 habitantes La incidencia para varicela tuvo una reducción drástica después de la introducción de la vacuna en los programas nacionales de inmunización. Costa Rica introduce a partir del año 2007 la

vacuna contra varicela en su esquema oficial, para todos los niños de 15 meses de edad alcanzando reducción de casos, y disminución en hospitalizaciones del 97% en niños menores de 5 años. En el año 2018, el Ministerio de Salud realiza el cambio del tipo de vacuna y paso a utilizarse la cepa OKA, cambio que se hizo visible en la tasa de notificación de la varicela considerando que en el 2016 se registró una tasa de 43 por 100 000 habitantes y para el 2021 pasó a 12,6 por 100 000 habitantes.

En Costa Rica, en el año 2023, se han notificado un total de 67 casos acumulados de varicela, representando una disminución en el número de casos notificados del 50,4% respecto a la misma semana del año 2022 (135 casos acumulados SE 5). La región Central Sur en el año 2023, registra el mayor número de casos de varicela con un 31,3% del total de casos, y en segundo lugar la región Pacífico Central notificando un 17,9% del total de casos de varicela.

Al comparar, el número de casos notificados entre el año 2023 y 2022, se evidencia una considerable disminución de casos, sin embargo, se analiza y se establece las hipótesis, primero, es probable que no se están notificando algunos casos, segundo, que el número de casos ha disminuido considerablemente.

Cuadro 1.


Costa Rica: Casos de varicela y porcentaje de variación relativa por Región, 2022-2023

REGIÓN	Casos 2022	Casos 2023	Porcentaje casos 2023	% VARIACIÓN RELATIVA
Brunca	18	0	0,0	-100,0
Central Este	6	3	4,5	-50,0
Central Norte	12	3	4,5	-75
Central Sur	31	21	31,3	-32,3
Chorotega	16	7	10,4	-56,3
Huetar Caribe	9	9	13,4	0,0
Huetar Norte	9	7	10,4	-22,2
Occidente	13	5	7,5	-61,5
Pacífico Central	21	12	17,9	-42,9
TOTAL	135	67	100,0	-50,4

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

Gráfico 1.

Costa Rica: Número de casos de varicela notificados, según semana epidemiológica, enero-febrero 2023.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud, USIS

Debido a los datos antes descritos, se recomienda actualizar la información de la vigilancia para la varicela y solicitar a los servicios de salud que notifiquen los casos de varicela con el fin de contar con datos que se puedan utilizar para el análisis y la toma de decisiones.

Brote de Varicela Centro Penal Gerardo Rodríguez (CAIGRE)

Antecedentes.

El CAI Gerardo Rodríguez, cuenta con una población total de 1351 personas privados de libertad, 263 sentenciados y 1088 indiciados (prisión preventiva); distribuido en 14 módulos o dormitorios, y 2 dormitorios de aislamientos preventivos; posee espacios en común como, cancha de fútbol, gimnasio y aulas. El dormitorio 13 tiene 136 personas privadas de libertad y el dormitorio 14, 129 personas privados de libertad. Los módulos 13 y 14 físicamente se encuentran distantes de del resto, con una población total de 265.


El 7 de enero 2023, en el CAIGRE se reporta el primer caso de varicela, el 12 de enero se reportaron tres casos más, sumando un total de 4 casos confirmados, razón por la cual se generó la alerta de brote, se tomaron medidas preventivas sanitarias y orden sanitaria como medida de contención.

Del 7 de enero al 16 de febrero del presente año, se contabiliza un total de 25 casos confirmados, **1 caso están activo y 24 casos están recuperados.**

Al generarse la alerta de brote se procedió al seguimiento del comportamiento de este, manteniendo los datos actualizados el instrumento de brote, realizando análisis de la información, y revisión constante de las acciones de contención del brote. Se mantuvo comunicación constante con el DARS de Alajuela 2, esta a su vez con el personal de Salud del CAI GRE, en retroalimentación constante de los datos del brote y medidas de contención. A nivel nacional se conformó un equipo (Ministerio de Salud, C.C.S.S y Ministerio de Justicia Y Paz) que analizó el comportamiento del brote semanalmente y de común acuerdo se emiten recomendaciones de acciones para el abordaje y contención. Entre las acciones que se están realizando como medida sanitaria, es la vacunación para los funcionarios y trabajadores para fortalecer la inmunidad de esta población y evitar transmisión comunitaria.

Gráfico 2.

CAI Gerardo Rodríguez Echeverría: Incidencia de casos de varicela por día, del 7 de enero al 16 de febrero, Alajuela, 2023.



Fuente: Informe Alerta de brote varicela CAI, Gerardo Rodríguez, enero-febrero. 2023, DARS A2

Los 25 casos de varicela son hombres, ubicados en los dormitorios 13 y 14 del CAIGRE, con un rango de edad de 19 a 66 años, con una media en edad de 33 años.

Gráfico 3.

CAI Gerardo Rodríguez Echeverría: Número de casos del brote de varicela según grupo de edad, del 7 enero al 16 febrero, 2023.

Grupo etario	Casos
19 años	1
20 - 24 años	5
25 - 29 años	7
30 - 34 años	1
35 - 39 años	2
45 - 49 años	7
50 - 54 años	1
65 y más años	1
Total	25

Fuente: Informe Alerta de brote varicela CAI, Gerardo Rodríguez, enero-febrero. 2023, DARS A2

El Ministerio de Salud desde la Unidad de Epidemiología y la Dirección de Vigilancia de la Salud, agradece el compromiso y esfuerzo de los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, la CCSS, y el trabajo en equipo en los tres niveles de gestión.

Infecciones de Transmisión Sexual

Lennya Centeno Víctor

Unidad de Epidemiología

lennya.centeno@misalud.go.cr

Stephany Alvarado Garita

Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud

stephany.alvarado@misalud.go.cr

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) pueden desencadenar importantes consecuencias para salud tanto de adultos como en niños, razón por la cual la vigilancia de las ITS resulta importante para disminuir y contener la transmisión de estas patologías y así poder contener la epidemia de las ITS.

A nivel mundial, los esfuerzos para detener la epidemia de ITS están guiados por la Estrategia Mundial de la Salud del Sector de Salud de las ITS, 2016-2021, que proporciona objetivos, metas y acciones prioritarias. A nivel regional, el Plan de Acción para la Prevención y el Control del VIH y de las Infecciones de Transmisión Sexual 2016-2021 apoya una respuesta acelerada, enfocada, más eficaz, innovadora y sostenible por los países de las Américas, allanando el camino hacia el objetivo de poner fin a las epidemias de SIDA y de las ITS como problemas de salud pública para 2030 contemplados en los ODS y para los cuales nuestro país ha adquirido compromisos en el control y erradicación de estas enfermedades (OPS, 2023).

Los eventos de Clamidiasis y Tricomoniasis no se describen en este apartado debido a que no se notifican en este momento según lo establecido por el Decreto 40556-S.


Sífilis

La Sífilis es una enfermedad causada por el *Treponema pallidum* y genera una importante morbilidad e incluso puede generar la muerte en algunos casos, la Sífilis es la ITS más notificada en nuestro país.

En relación con esa enfermedad, el rango de edad con más notificación es el de 20 a 39 años. Según el sexo se reportan más casos en hombres con una tasa de 3,6 con respecto a la mujer con 2,2, al cierre de la semana 05 del 2023.

Gráfico 1.

Costa Rica. Total, de casos de Sífilis todas sus formas, según semana epidemiológica. 2023.




Datos preliminares.

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud.

Gráfico 2.

Costa Rica: Incidencia de Sífilis todas formas, según Región Rectora de Salud, 2023. (Tasa p/100.000 habitantes).




Datos preliminares.

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud.

La provincia con la tasa de incidencia más alta a la semana 04, es la provincia de San José con una tasa de 2,9. Así como la Región Huetar Caribe es la que concentra la tasa más alta con un 6,5, ver gráfico 2.

Gráfico 3.

Costa Rica. Incidencia de Sífilis todas sus formas según Provincia. 2023. (Tasa p/100.000 habitantes)



Datos preliminares.

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud.

Se finaliza la semana 5 con un total preliminar de 153 casos de Sífilis y una tasa total del 2,9. siendo del total reportado 95 casos de sexo masculino y 58 casos para el sexo femenino.


Gonorrrea

La Gonorrrea es una infección bacteriana que causas por *Neisseria gonorrhoeae* y genera problemas en muchos órganos y es la segunda ITS más frecuente. Según semana epidemiológica (SE), 69 casos reportado en la quinta SE del 2023.

La Región Pacífico Central es la que reporta una tasa de 3,5 al cierre de la semana 5.

Gráfico 4.

Costa Rica. Total, de casos de Gonorrrea según semana epidemiológica. 2023.




Datos preliminares.

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud.

Gráfico 5.


Costa Rica. Incidencia de Gonorrrea según Provincia. 2023. (Tasa p/100.000 habitantes)



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud

Gráfico 6.

Costa Rica. Incidencia de Gonorrea según Región Rectora de Salud. 2023. (Tasa p/100.000 habitantes)




Datos preliminares.

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud.

Los casos reportados a la semana 5, corresponden a 58 hombres y 11 mujeres. La edad de presentación corresponde al quinquenio de 20 a 24 años, lo que coincide con las edades sexualmente más activas.

Gráfico 7.

Costa Rica. Total, de casos de Gonorrea según grupos de edad para ambos sexos. 2023



Datos preliminares

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud.


Herpes Virus

El Virus del Herpes tipo 2 (VHS-2) es un virus que genera lesiones en el área genital. Se transmite casi exclusivamente por vía sexual. La mayoría de las personas desconocen que son portadoras del virus.

En el gráfico 8, se puede observar que la Región Central Sur y la Huetar Norte concentran la tasa la más alta con 1,1; datos al cierre de la semana 5.

Gráfico 8.

Costa Rica. Incidencia de Herpes Virus, según Región Rectora de Salud. 2022. (Tasa p/100.000 habitantes)




Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud

La provincia con más casos reportados a la semana 5 son las provincias de San José y la provincia de Puntarenas. Y el grupo etario más afectado corresponde al grupo entre 20 y 24 años.

Gráfico 9.

Costa Rica. Incidencia de Herpes virus, según Provincia. 2023. (Tasa p/100.000 habitantes)



Datos preliminares.

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud.