

Boletín epidemiológico N° 19 - 2017**Enfermedades Transmitidas por Vectores**
ZIKA 10 cantones con mayor tasa de incidencia notificada, semana 1-19, 2017, Costa Rica

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Siquirres	250	159
Orotina	237	54
Matina	208	93
Esparza	123	45
San Mateo	101	7
Garabito	75	18
Guácimo	69	36
Limón Central	64	63
Abangares	61	12
Puntarenas	61	82

Total de casos Notificados: 820

Confirmados*: 161

2016

2017

Confirmados

2	2	150
3	0	27
CASOS DE SÍNDROME CONGÉNITO ASOCIADOS A ZIKA	CASOS DE SÍNDROMES NEUROLÓGICOS ASOCIADOS A ZIKA	MUJERES EMBARAZADAS
3 CASOS PROBABLES	0 CASOS PROBABLES	1 CASOS PROBABLES

A la semana 19

Criaderos potenciales abordados:

Eliminados 465 605
Tratados 913 300
Total: 1 378 905
Casas visitadas 285 211
Casas


Fumigadas 122 400
Criaderos con huevecillos o larvas

12 342

*Los casos que se procesan por laboratorio corresponden a caracterizaciones de brotes o sospechas por complicaciones

Chikungunya

Tendencia de casos de Chikungunya, por semana epidemiológica
2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de
Chikungunya, semanas 1-19, 2017

Cantón	Tasas (x100.000)	Casos
Montes de Oro	43	6
Bagaces	26	6
Limón Central	21	21
Esparza	19	7
San Mateo	14	1
Carrillo	14	6
Garabito	12	3
Puntarenas	10	14
Abangares	10	2
Santo Domingo	8	4

Casos Acumulados
Semana 1-19
2016-2017

Año 2017

139


Año 2016

1597

Tasa Actual País:
2,8 por 100.000

Dengue

Distribución casos de Dengue, por semana epidemiológica
2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Dengue,
semanas 1- 19, 2017

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Montes De Oro	274	38
Matina	201	90
Atenas	172	4
Siquirres	131	83
Guácimo	99	52
Pococí	96	138
Parrita	94	18
Garabito	87	21
Sarapiquí	81	62
Talamanca	74	30

Casos Acumulados
Semana 19
2016-2017

Año 2017

1322

Año 2016

7325


Casos graves: 0

Serotipos circulantes: 1 y 2

Tasa Actual País:
26,7 por 100.000

Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los 20 cantones con mayor actividad*, últimas 3 semanas 2017

Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 17	Sem 18	Sem 19
Matina	6	10	13
Siquirres	2	7	16
Puntarenas Central	5	3	8
Talamanca	4	4	1
Guácimo	2	8	4
Turrialba	3	3	5
Pococí	3	11	0
San José Central	2	2	0
Golfito	6	2	0
Desamparados	1	4	1
Aserri	3	1	0
Montes de Oca	0	1	1
Perez Zeledón	0	6	1
Alajuela Central	0	1	2
Grecia	1	0	1
Orotina	0	2	1
Flores	0	1	2
Esparza	1	4	0
Montes De Oro	1	1	3
Aguirre	1	0	4



* Ordenados de mayor a menor según la mediana.
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica

1



Llantas en desuso

2



Tanques y baldes

3



Tarros

4




Plásticos negros para cubrir

5




Bebedores y platos maceta

Malaria



Zonas de riesgo de transmisión de Malaria en Costa Rica



Casos de Malaria, Costa Rica, período 2006-2017

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	1	3

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus*, que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud