

Boletín epidemiológico N° 20 - 2017**Enfermedades Transmitidas por Vectores**
ZIKA 10 cantones con mayor tasa de incidencia notificada, semana 1-20, 2017, Costa Rica

A la semana 20

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Siquirres	263	167
Orotina	237	54
Matina	208	93
Esparza	126	46
San Mateo	101	7
Garabito	79	19
Guácimo	73	38
Limón Central	66	65
Abangares	61	12
Puntarenas Central	61	82

Total de casos Notificados: 847**Confirmados*: 169**

2016

2017

Confirmados


2	2	150
3	0	27
CASOS DE SÍNDROME CONGÉNITO ASOCIADOS A ZIKA	CASOS DE SÍNDROMES NEUROLÓGICOS ASOCIADOS A ZIKA	MUJERES EMBARAZADAS
3 CASOS PROBABLES	0 CASOS PROBABLES	1 CASOS PROBABLES

Criaderos potenciales abordados:**Eliminados 496 017****Tratados 981 097****Total: 1 477 114****Casas visitadas 301 383****Casas Fumigadas****126 740****Criaderos con huevecillos o larvas****13 976**

*Los casos que se procesan por laboratorio corresponden a caracterizaciones de brotes o sospechas por complicaciones

Chikungunya

Tendencia de casos de Chikungunya, por semana epidemiológica
2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de
Chikungunya, semanas 1-20, 2017

Cantón	Tasas (x100.000)	Casos
Montes De Oro	43	6
Bagaces	26	6
Limón Central	23	23
Esparza	19	7
San Mateo	14	1
Carrillo	14	6
Garabito	12	3
Puntarenas Central	10	14
Abangares	10	2
Santo Domingo	8	4

Casos Acumulados
Semana 1- 20
2016-2017

Año 2017

148


Año 2016

1622

Tasa Actual País:
3,0 por 100.000

Dengue

Distribución casos de Dengue, por semana epidemiológica
2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Dengue,
semanas 1- 20, 2017

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Montes De Oro	281	39
Matina	221	99
Atenas	179	51
Siquirres	129	82
Pococí	114	164
Guácimo	109	57
Parrita	105	20
Garabito	91	22
Talamanca	84	34
Sarapiquí	81	62

Casos Acumulados
Semana 20
2016-2017

Año 2017

1447

Año 2016

7563

Casos graves: 0


Serotipos circulantes: 1 y 2

Tasa Actual País:
29,2 por 100.000

Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los 20 cantones con mayor actividad*, últimas 3 semanas 2017

Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 18	Sem 19	Sem 20
Siquirres	1	15	10
Matina	7	14	8
Pococí	12	7	3
Perez Zeledón	6	3	16
Turrialba	3	5	5
Guácimo	5	5	6
Tibas	4	4	0
Talamanca	5	4	0
Desamparados	3	3	0
Alajuela Central	1	3	11
Puntarenas Central	3	8	3
Limón Central	3	0	5
Atenas	2	0	3
Esparza	2	0	3
Buenos Aires	0	4	2
Aguirre	0	4	2
Garabito	0	3	2
San José Central	2	1	0
Moravia	1	1	0
Montes de Oca	1	2	0

* Ordenados de mayor a menor según la mediana.
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.



Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica

1



Llantas en desuso

2



Tanques y baldes

3



Tarros

4




Plásticos negros para cubrir

5




Bebederos y platos maceta

Malaria



Zonas de riesgo de transmisión de Malaria en Costa Rica



Casos de Malaria, Costa Rica, período 2006-2017

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	1	3

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus*, que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud