

Boletín epidemiológico N° 21- 2017**Enfermedades Transmitidas por Vectores**
ZIKA 10 cantones con mayor tasa de incidencia notificada, semana 1-21, 2017, Costa Rica

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Siquirres	270	172
Orotina	237	54
Matina	210	94
Esparza	131	48
San Mateo	101	7
Garabito	87	21
Guácimo	75	39
Limón Central	66	65
Puntarenas	62	83
Abangares	61	12

Total de casos Notificados: 866

Confirmados*: 181

2016

2017

Confirmados

2	2	150
3	0	27
CASOS DE SÍNDROME CONGÉNITO ASOCIADOS A ZIKA	CASOS DE SÍNDROMES NEUROLÓGICOS ASOCIADOS A ZIKA	MUJERES EMBARAZADAS
3 CASOS PROBABLES	0 CASOS PROBABLES	1 CASOS PROBABLES

A la semana 21

Criaderos potenciales abordados:

Eliminados
524 961

Tratados
1041 770

Total: 1 566 731
Casas visitadas
315 636

Casas Fumigadas


134 182
Criaderos con huevecillos o larvas

15 352

*Los casos que se procesan por laboratorio corresponden a caracterizaciones de brotes o sospechas por complicaciones

Chikungunya

Tendencia de casos de Chikungunya, por semana epidemiológica
2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de
Chikungunya, semanas 1- 21, 2017

Cantón	Tasas (x100.000)	Casos
Montes De Oro	43	6
Bagaces	26	6
Limón Central	25	25
Esparza	19	7
San Mateo	14	1
Carrillo	14	6
Garabito	12	3
Puntarenas	11	15
Abangares	10	2
Matina	9	4

Casos Acumulados
Semana 1- 20
2016-2017

Año 2017

158


Año 2016

1654

Tasa Actual País:
3,2 por 100.000

Dengue

Distribución casos de Dengue, por semana epidemiológica
2016-2017



Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Dengue,
semanas 1-21, 2017

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Montes De Oro	281	39
Matina	248	111
Atenas	183	52
Siquirres	137	87
Guácimo	134	70
Pococí	118	170
Parrita	105	20
Garabito	91	22
Talamanca	88	36
Esparza	82	30

Casos Acumulados
Semana 21
2016-2017

Año 2017

1569

Año 2016

7863


Casos graves: 0

Serotipos circulantes: 1 y 2

Tasa Actual País:
31,7 por 100.000

Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los 20 cantones con mayor actividad*, últimas 3 semanas 2017

Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 19	Sem 20	Sem 21
Matina	13	7	8
Siquirres	3	6	5
Turrialba	4	4	4
Guácimo	4	7	1
San José	3	3	3
Pococí	3	4	0
Talamanca	3	3	1
Limón Central	3	2	2
Desamparados	2	1	0
Santa Ana	2	1	0
Tibás	1	1	0
Alajuela Central	2	1	0
San Mateo	0	1	1
Orotina	0	2	1
San Carlos	1	1	0
Esparza	1	3	1
Buenos Aires	1	1	1
Montes De Oro	0	4	1
Quepos	0	1	1
Golfito	3	1	0



* Ordenados de mayor a menor según la mediana.
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica

1



Llantas en desuso

2



Tanques y baldes

3



Tarros

4



Plásticos negros para cubrir


5




Bebederos y platos maceta

Malaria

Casos de Malaria según cantón
2016



Zonas de riesgo de
transmisión de Malaria en
Costa Rica



Casos de Malaria, Costa Rica, período 2006-2017

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	2	3

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus*, que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud