

Boletín epidemiológico N° 05 - 2018

Enfermedades Transmitidas por Vectores



ZIKA Cantones con mayor tasa de incidencia notificada, semana 4- 2018,

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Guácimo	23	12
Siquirres	11	7
Pococí	10	14
Matina	9	4
Talamanca	5	2
Orotina	4	1
Limón Central	2	2

Acciones de control del A. aegypti a Semana 5

Criaderos potenciales abordados:



Eliminados
105 873

Tratados
204 167

Total: 310 040

Casas abordadas:

Inspeccionadas
61 338

Fumigadas
8 398



Total: 69 736

Criaderos con huesecillos o larvas



3 805

Casos Notificados: **48**

Casos Confirmados: **4**

TASA NACIONAL
(notificados)

1.0

Casos Confirmados 2017: **300**

COMPLICACIONES ASOCIADAS

Casos confirmados

0

SÍNDROME CONGÉNITO Y/O
MICROCEFALIA ASOCIADO A ZIKA

0

SÍNDROME NEUROLÓGICO
ASOCIADO A ZIKA

0

MUJERES EMBARAZADAS CON ZIKA

Casos Probables

0

0

0

Casos confirmados

7

0

94

Casos probables

5

0


6

2018

2017


ZIKA

Tendencia de casos de Zika , por
semana epidemiológica 2017-2018



DENGUE

Tendencia de casos de Dengue , por
semana epidemiológica 2017-2018



Dengue

Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de
Dengue, semana 4 año 2018

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Matina	34	15
Siquirres	16	10
Turrialba	12	9
Parrita	10	2
Buenos Aires	10	5
Guácimo	10	5
Quepos	9	3
Pococí	8	11
Golfito	7	3
Santa Cruz	6	4

Casos Acumulados
Semana 4
2017-2018

Año 2018

115

Año 2017

604

Tasa nacional x 100.000
(notificados) : 2.3

Chikungunya

Casos Acumulados
Semana 4
2017-2018

Año 2018

5

Año 2017

80

Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los cantones con mayor actividad*, las últimas 3 semanas, 2018

Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 2	Sem 3	Sem 4
Siquirres	5	6	3
Pococí	10	1	2
Guácimo	4	6	3
Matina	3	5	3
Turrialba	5	3	2
Perez Zeledón	3	2	3
Puntarenas	2	2	1
Alajuela Central	3	1	0
San José	1	1	1
Atenas	1	2	0
Santa Cruz	0	2	1
Carrillo	0	2	1
Quepos	1	0	2
Limón Central	1	1	1
Grecia	0	1	1
Buenos Aires	2	0	0
Golfito	0	2	0
Talamanca	0	1	1

* Ordenados de mayor a menor según la mediana.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica

1



Llantas en desuso

2



Tanques y baldes

3



Tarros

4



Plásticos negros para cubrir


5



Bebederos y platos maceta

Malaria

Zonas de riesgo de transmisión de Malaria en Costa Rica



Casos de Malaria, Costa Rica, período 2006-2018

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	12	13
2018	0	0

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus*, que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud