

Boletín epidemiológico N° 07 - 2018

Enfermedades Transmitidas por Vectores



ZIKA

cantones con mayor tasa de incidencia notificada, semana 7- 2018, Costa Rica

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Guácimo	22	41
Matina	9	20
Pococí	27	18
Siquirres	11	17
Talamanca	5	12
Limón Central	6	6

**Casos Acumulados semana 7
2017-2018**

2018: 91

2017: 500

Casos confirmados 2018*: 5

TASA NACIONAL
por 100.000 hab
(notificados)

1.8

Acciones de control
del *A. aegypti*

Semana 8

**Criaderos
potenciales
abordados:**



Eliminados
188 291

Tratados
365 555

Total: 553 846

Casas abordadas:

Inspeccionadas
109 416

Fumigadas
18 164



Total: 127 580

**Criaderos con
huevecillos o
larvas**



6 125

COMPLICACIONES ASOCIADAS

Casos confirmados

0

SÍNDROME CONGÉNITO Y/O
MICROCEFALIA ASOCIADO A ZIKA

0

SÍNDROME NEUROLÓGICO
ASOCIADO A ZIKA

0

MUJERES EMBARAZADAS CON ZIKA

Casos Probables

0

0

0

Casos confirmados

7

0

101

Casos probables

5

0

2018


2017

*Los casos que se procesan por laboratorio corresponden a brotes o complicaciones

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud e INCIENSA, Ministerio de Salud


ZIKA

Tendencia de casos de Zika , por
semana epidemiológica 2017-2018



DENGUE

Tendencia de casos de Dengue , por
semana epidemiológica 2017-2018



Dengue

Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de
Dengue, semana 7 año 2018

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Matina	60	27
Sarapiquí	55	43
Atenas	38	11
Siquirres	31	20
Guácimo	23	12
Pococí	17	25
Talamanca	17	7
Turrialba	15	11
Quepos	13	4

Casos Acumulados
Semana 7
2017-2018

Año 2018

259

Año 2017

833

Tasa nacional x 100.000
(notificados) : 5.2

Chikungunya

Casos Acumulados
Semana 7
2017-2018

Año 2018

13

Año 2017

396

Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los cantones con mayor actividad*, las últimas 3 semanas, 2018

Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 5	Sem 6	Sem 7
Sarapiquí	9	5	6
Siquirres	4	12	4
Guácimo	6	11	3
Pococí	12	5	1
Matina	6	3	2
Alajuela Central	0	3	5
Perez Zeledón	1	2	4
Turrialba	0	4	2
Talamanca	0	4	1
Carrillo	3	1	1
Golfito	2	2	0
Santa Cruz	0	2	1
Puntarenas	1	1	1
Grecia	0	1	1
Heredia Central	1	0	1
Quepos	1	0	1
Limón Central	0	1	1

* Ordenados de mayor a menor según la mediana.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica

1



Llantas en desuso

2



Tanques y baldes

3



Tarros

4



Plásticos negros para cubrir


5



Bebedores y platos maceta

Malaria

Zonas de riesgo de transmisión de Malaria en Costa Rica



Casos de Malaria, Costa Rica, período 2006-2018

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	12	13
2018	0	3

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus*, que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud