

Boletín epidemiológico N° 08- 2018

Enfermedades Transmitidas por Vectores



ZIKA

cantones con mayor tasa de incidencia notificada, semana 9- 2018, Costa Rica

Cantón	Tasas x 100.000	Casos
Guácimo	23	43
Matina	10	22
Pococí	31	21
Siquirres	12	19
Talamanca	5	12
Limón Central	10	10
Sarapiquí	4	5

Casos Acumulados semana 9
2017-2018

2018: 110

2017: 504

Casos confirmados 2018*: 5

TASA NACIONAL
por 100.000 hab
(notificados)

2.2

COMPLICACIONES ASOCIADAS

Casos confirmados

0

SÍNDROME CONGÉNITO Y/O
MICROCEFALIA ASOCIADO A ZIKA

0

SÍNDROME NEUROLÓGICO
ASOCIADO A ZIKA

0

MUJERES EMBARAZADAS CON ZIKA

Casos Probables

0

0

1

Casos confirmados

7

0

114

Casos probables

5

0

4

Acciones de control
del *A. aegypti*

Semana 10

**Criaderos
potenciales
abordados:**



Eliminados
247 806

Tratados
365 555

Total: 702 582

Casas abordadas:

Inspeccionadas
140 124

Fumigadas
22 078



Total: 162 202

**Criaderos con
huevecillos o
larvas**




7 148

*Los casos que se procesan por laboratorio corresponden a brotes o complicaciones

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud e INCIENSA, Ministerio de Salud


ZIKA

Tendencia de casos de Zika , por
semana epidemiológica 2017-2018



DENGUE

Tendencia de casos de Dengue , por
semana epidemiológica 2017-2018



Dengue

Diez cantones con mayor tasa de incidencia notificada de Dengue, semana 9 año 2018

Cantón	Tasa (x100.000)	Casos
Sarapiquí	59	75
Matina	30	66
Atenas	12	42
Guácimo	20	38
Siquirres	19	30
Pococí	38	26
Talamanca	8	19
Parrita	3	15
Turrialba	10	14

Casos Acumulados
Semana 9
2017-2018

Año 2018

318

Año 2017

945

Tasa nacional x 100.000
(notificados) : 6.4

Chikungunya

Casos Acumulados
Semana 9
2017-2018

Año 2018

15

Año 2017

111

Casos reportados de enfermedades transmitidas por vectores en los cantones con mayor actividad*, las últimas 3 semanas, 2018

Cantón	Casos sumados de Dengue, Chikungunya y Zika		
	Sem 7	Sem 8	Sem 9
Sarapiquí	10	9	1
Guácimo	6	9	3
Pococí	6	5	1
Matina	2	2	5
Limón Central	5	3	0
Alajuela Central	5	2	0
Siquirres	2	1	3
Puntarenas	2	2	1
San José	1	1	2
Esparza	1	1	1
Quepos	0	3	0
Garabito	3	0	0
Santa Ana	2	0	0
Coronado	0	2	0
Perez Zeledón	0	1	1
Turrialba	2	0	0
Carrillo	0	2	0
Golfito	2	0	0

* Ordenados de mayor a menor según la mediana.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Criaderos más frecuentes del *A. aegypti* en Costa Rica

1



Llantas en desuso

2



Tanques y baldes

3



Tarros

4



Plásticos negros para cubrir


5



Bebedores y platos maceta

Malaria

Zonas de riesgo de transmisión de Malaria en Costa Rica



Casos de Malaria, Costa Rica, período 2006-2018

Año	Número de casos autóctonos	Número de casos importados
2006	2913	0
2007	1223	0
2008	966	0
2009	262	1
2010	114	2
2011	16	1
2012	0	1
2013	0	4
2014	0	5
2015	0	8
2016	4	9
2017	12	13
2018	0	3

Nota: La Malaria es transmitida en nuestro país principalmente por el mosquito *Anopheles albimanus*, que tiene patrones de comportamiento y sitios de cría diferentes al mosquito que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya.

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud