

INSUMOS PROGRAMA MANEJO INTEGRAL CONTROL DE VECTORES

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	PRESENTACION	TIPO DE PRODUCTO	APLICACIÓN	DOSIS
ABATE 1 SG	Temephos al 1%	Sacos de 20 Kg	Larvicida organofosforado	Directamente en lo criaderos con agua o en aquellos que eventualmente podrían contener agua. Se puede utilizar en alcantarillados donde haya agua estancada o con un flujo bajo de agua, siempre y cuando este no tenga un vertido directo en cuerpos de agua naturales, como un río o el mar.	Ver Anexo 1
NATULAR DT	Spinosad	Blister con 50 tabletas ranuradas	Larvicida biologico	Aplicar en todos los tanques o estañones, tengan o no larvas de Aedes u otros culícidos, aplicar directamente en los tanques o estañones que eventualmente podrían contener agua.	1 tableta para 200 litros de agua o media tableta para 100 litros.
SUMILARV 2MR	Pyriproxifen	Disco	Larvicida	Directo al agua	1 disco por 40-500 litros de agua.
BACTIVEC CONCENTRADO	Bacillus thuringiensis israelensis (BTI)	Envases de 10 litros	Larvicida biologico	En criaderos temporales o permanentes donde haya larvas de distintas especies de culícidos, se puede usar en cualquier sistema de alcantarillados con agua estancada o con un flujo bajo de agua, se puede aplicar con motomochila en caso de cuerpos de agua o criaderos de gran tamaño; la motomochila debe estar limpia, garantizando que no queden residuos de insecticidas u otras sustancias que eventualmente puedan afectar la bacteria. NO APLICAR CON TERMONEBULIZADORA	1 CC por litro de agua a tratar.
VECTOLEX 7.5 GR	Bacillus sphaericus	Sacos de 18.14 Kg	Larvicida biologico	Utilizar en criaderos permanentes donde haya larvas de Anopheles.	Ver Anexo 2
				Nebulizacion en caliente (Termonebulizadoras).	20 CC de Aquarelin en 980 CC de agua para temonebulizacion.

AQUA RESLIN SUPER	Permetrina Esbioaletrina Butoxido de piperonilo (PBO)	Envases de 1 litro	Adulticida piretroide	Nebulizacion en frio (Maquina Leco).	2 litros de Aqueslin en 17 litros de agua. 4 litros de Aqueslin en 34 litros de agua. 6 litros de Aqueslin en 51 litros de agua. Para uso en maquina Leco, calibrada 340 CC X minuto a 1800rpm.
FENDONA 6% SC	Alfacipermetrina	Envases de 1 litro	Adulticida piretroide residual	Rociado intra o extra domiciliario con bombas de aspersión tipo Hudson o Motomochila tipo Stihl.	5 a 10 CC por litro de agua.

ANEXO 1 Dosificación correcta del Temephos (Abate)

Volumen del depósito en litros	Gramos de Temephos al 1% granular	Cantidad en medidas
1 a 5 litros	0.5 gramos	1 pizca
6 a 10 litros	1.0 gramos	2 pizcas
11 a 15 litros	1.5 gramos	3 pizcas
16 a 20 litros	2.0 gramos	4 pizcas
21 a 25 litros	2.5 gramos	5 pizcas
26 a 50 litros	5.0 gramos	1/4 cucharada sopera
51 a 100 litros	10 gramos	1/2 cucharada sopera
101 a 150 litros	15 gramos	3/4 cucharada sopera
151 a 200 litros	20 gramos	1 cucharada sopera

ANEXO 2 Dosificación correcta del Vectolex GR (Bacillus Sphaericus)

Dosis de aplicación contra mosquitos, hábitat del mosquito (para el control de especies de Culex y Anopheles, en hábitats como los siguientes).	Dosis recomendada.
Alto contenido orgánico Lagunas de aguas residuales, arroyos sépticos, lagunas de desechos de animales y sitios similares.	5-10 Kg/ha
Áreas infestadas donde son necesarios controles residuales, o en hábitats que posean aguas profundas, superficie con cobertura densa.	10-20 Kg/ha