

# TRATAMIENTO

- Uso de antibióticos en todos los casos, independientemente de la severidad
- Además se deben tratar los contactos directos y aquellas personas que por medio de investigación epidemiológica lo ameriten, con los mismos esquemas
- Hidratar el paciente con suero de rehidratación oral.
- Una vez hidratado, recibirá tratamiento antimicrobiano

# TRATAMIENTO

Grupo de edad	Antibiótico de primera línea	Antibiótico alternativo
Adultos	Doxiciclina, 300 mg, VO, dosis única	Ciprofloxacina 1 gr, una dosis VO. Azitromicina 1 gr, VO, dosis única.
Embarazadas y mujeres dando lactancia	Azitromicina 1g VO, dosis única	
Niños menores de 8 años	Azitromicina 20mg/kg VO, dosis única	Ciprofloxacina 20/mgkg VO (máximo 1g), dosis única
Niños mayores de 8 años	Doxiciclina 300mg VO, dosis única	Azitromicina 1 g VO dosis única

# TRATAMIENTO

- Cambio de línea con base en las resistencias del germen al antibiótico demostradas por laboratorio (PSA).
- Antibióticos alternativos serán una opción ante las siguientes condiciones:
  - Alergia conocida al medicamento de primera línea.
  - Reacción alérgica al medicamento primera línea.
  - Falla terapéutica al medicamento primera línea.
  - Resistencia local demostrada por laboratorio

# TRATAMIENTO

- Ciprofloxacino y Doxiciclina no se puede utilizar en menores de 8 años ni embarazadas
- Todos los medicamentos están disponibles en la CCSS
- Protocolo acorde con lineamiento institucional CCF 0685-02-14