

CONOZCAMOS MÁS SOBRE EL PAPALOMOYO (Leishmaniasis) Y SU PREVENCIÓN



OPS



**MINISTERIO
DE SALUD**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

QUÉ ES LA LEISHMANIASIS?

En Costa Rica
es más conocida como
PAPALOMOYO

Es una enfermedad causada por
un parásito (*Leishmania*) que es
transmitido al humano por la
picadura de un insecto
(como una mosca pequeña)
que se alimenta
de sangre.



CUÁLES ANIMALES?

MANTIENEN EL PARÁSITO EN LA NATURALEZA



En el campo o en la casa, existen animales mamíferos como **perros, roedores, perezosos, osos hormigueros**, etc. que pueden tener el parásito.

El insecto al picar a estos animales, chupa sangre y parásitos volviéndose infeccioso.

¿CÓMO SE TRANSMITE EL PAPALOMOYO? (Leishmaniasis)



El insecto crece en sitios **sombreados y húmedos** como huecos de árboles, nidos de animales o madrigueras y entre hojas o el monte.



El parásito es transmitido a la persona cuando la pica el insecto infectado, el cual le chupa la sangre e inyecta los parásitos en el sitio de la picadura.



Pican más al atardecer y durante la noche.

¿CÓMO SON LAS LESIONES?

Lo más común es que se produzcan llagas o lesiones en la piel (úlceras), esto se conoce como **Leishmaniasis cutánea**.

Sin embargo, también se pueden generar lesiones en la nariz o la boca (**Leishmaniasis mucocutánea**) y afectar órganos como el hígado y el bazo (**Leishmaniasis visceral**).

EVOLUCIÓN DE LAS LESIONES

1



Lesión temprana
(protuberancia que no duele)

2



Inicio de úlcera

3



Úlceras avanzadas

Si la úlcera se infecta puede generar dolor, inflamación y pus.

¿ QUÉ DEBO HACER SI CREO QUE TENGO PAPALOMOYO ?

(Leishmaniasis)



Si presenta algunas de las lesiones anteriores y tiene más de dos semanas de evolución, **CONSULTAR** al **ESTABLECIMIENTO DE SALUD** más cercano.



**No le ponga nada a la
lesión, sólo lávela con
agua limpia y jabón**



No aplique remedios caseros



CÓMO **SE TRATA** EL PAPALOMOYO?

(Leishmaniasis)

El tratamiento consiste en inyecciones por un período de al menos 20 días. Está disponible en los establecimientos de salud de la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social).



Es importante que para **que se cure** de la leishmaniasis por completo **NO INTERRUMPA** el tratamiento.

CÓMO PREVENIR EL PAPALOMOYO?

(Leishmaniasis)



Si trabaja en el campo o va a visitar algún sitio montañoso use:



Sombrero de ala ancha



Camisa gruesa de manga larga



Pantalón largo y botas



Utilice repelente de mosquitos.



En su casa, use mosquiteros de malla fina diariamente.



Mantenga limpia su casa, libre de basura y monte.



OPS

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas



MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE COSTA RICA



OPS

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL DE LAS AMÉRICAS



**MINISTERIO
DE SALUD**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

Fuentes:

1. Manual de procedimientos para vigilancia y control de las leishmaniasis en las Américas [Internet]. Organización Panamericana de la Salud; 2019 [citado 1 de julio de 2021]. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/50524>
2. García-Almagro D. Leishmaniasis cutánea. Actas Dermo-Sifiliográficas. 1 de enero de 2005;96(1):1-24.
3. Rotafolio y trifoliar de Ministerio de Salud Pública y Asistencia social de Guatemala, OPS/OMS.
4. Dptico Nicaragua: "Medidas de prevención contra el flebótomo de Leishmaniasis".